

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

(R)

STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE
ET DE LA FORÊT
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Ancienne Conserverie de CASAMOZZA
LUCCIANA - 20290 - BORGIO -

☎ 95.36.05.70



EDITION CORSE

Bulletin Technique N° 86
du 18 Septembre 1986

-
- : - Cultures maraîchères = produits utilisables et précautions :
: à prendre dans la désinfection du sol. :
 - : - C'est le moment de traiter la gommose des agrumes. :
 - : - Pontes de processionnaire des pins. :
 - : - N'oubliez pas la vigne après le passage de la machine. :
 - : - Traitement contre la mouche de l'olive. :
-

CULTURES MARAICHÈRES

--> Plusieurs produits sont utilisables, mais quel que soit le produit, c'est une opération dangereuse qui doit être effectuée dans de bonnes conditions. Les applicateurs doivent porter des vêtements de protection et des masques équipés d'une cartouche adaptée au produit.


--> Avant la désinfection, il faut enlever le maximum de racines de la culture précédente. Le sol doit avoir été travaillé et arrosé. La terre doit être humide, émièttée, et meuble. Ne pas traiter si la température du sol est inférieure à 15° C.

--> Liste des produits utilisables (voir feuille jointe)

--> Le test du cresson doit être réalisé avant la mise en culture

[1] - Prélever de la terre à 10 - 15 cm de profondeur

[2] - Remplir deux bocaux de 1 Kg



[3] - Les fermer hermétiquement

[4] - Contrôler 24 à 48 heures après

** Si le sol traité ne contient plus de fumigant, les graines des deux bocaux germent en même temps ; il est possible de semer ou planter.

** Sinon attendre quelques jours et refaire le test.

AGRUMES

Exsudation de gomme, jaunissement des feuilles écorce se décollant par plaques au niveau du collet = ce sont les symptômes de **gombose**.

S'il n'est pas traité, l'arbre reste petit, et la végétation rabougrie.

Il faut éviter que l'eau stagne près des troncs. Pour cela, éloignez les goutteurs et facilitez l'écoulement de l'eau.

Une pulvérisation de phosethyl - al (ALIETTE) à 200 g de matière active par hl sera effectuée dans les vergers atteints dès la semaine prochaine.

PINS

Les premières pontes de **processionnaire du pin**, ont été observées depuis une quinzaine de jours. Ne pas intervenir pour l'instant. Un prochain bulletin fera le point.

VIGNE

Un traitement fongicide sera réalisé dans les 5 jours suivant le passage de la machine. Il facilitera la cicatrisation des bois et évitera ainsi le développement du **botrytis** à partir des blessures.

Préférez les matières actives suivantes = captafol, folpel ou cuivre.

OLIVE

Renouvelez le traitement contre **la mouche**.

-----0000000000-----